

核准日期：2007年03月07日
修改日期：2008年09月02日 2013年11月28日 2016年06月02日

华纳福
HUANAFU

胶体果胶铋干混悬剂说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

- 【药品名称】**通用名称：胶体果胶铋干混悬剂
商品名称：华纳福
英文名称：Colloidal Bismuth Pectin for Suspension
汉语拼音：Jiaoti Guojiaobi Ganhunxuanji
- 【成份】**本品活性成份为：胶体果胶铋，是一种果胶与铋生成的组成不定的复合物。
- 【性状】**本品为微黄色粉末或颗粒。
- 【适应症】**本品适用于治疗消化性溃疡，特别是幽门螺杆菌相关性溃疡，亦可用于慢性浅表性和萎缩性胃炎。
- 【规格】**150mg（以铋计）
- 【用法用量】**口服。一次150mg（1袋），加入到100ml温水中，混悬均匀后服用。一日4次，分别于3餐前1小时及临睡前服用，四周为一个疗程。
- 【不良反应】**偶可出现恶心、便秘等消化道症状。
- 【禁忌】**对本品过敏及肾功能不全者禁用。
- 【注意事项】**（1）本品连续使用一疗程后，症状未缓解或消失请咨询医师。
（2）服药期间若出现黑褐色无光泽大便但无其他不适，为正常现象。停药后1～2天后粪便色泽可转为正常。
（3）服用本品期间不得服用其他铋制剂，且本品不宜大剂量长期服用。
- 【孕妇及哺乳期妇女用药】**孕妇禁用。哺乳期妇女应用本品时应暂停哺乳。
- 【儿童用药】**未进行该项实验且无可靠参考文献。
- 【老年用药】**未进行该项实验且无可靠参考文献。
- 【药物相互作用】**本品不宜与制酸药、牛奶和H₂受体阻滞药同时服用，否则会降低药效。
- 【药物过量】**本品若大剂量长期服用，会出现铋中毒现象，表现为皮肤为黑褐色，应立即停药并作适当处理。
- 【药理毒理】**药理作用：本品为胃肠黏膜保护药。口服后在胃液内形成溶胶，与溃疡面及炎症表面有很强的亲和力，能形成有效的保护膜，隔离胃酸，保护受损的黏膜，并刺激胃肠黏膜上皮细胞分泌粘液，促进上皮细胞自身修复。本品对受损黏膜的粘附性甚佳。本品尚能杀灭胃幽门螺杆菌。
毒理研究：未进行该项实验且无可靠参考文献。
- 【药代动力学】**本品口服后在肠道吸收甚微，血药浓度与尿药浓度极低，绝大部分本品随粪便排出体外。痕量的铋吸收后主要分布于肝、肾等组织中，以肾脏居多，主要通过肾排泄。
- 【贮藏】**遮光，密封，在干燥处保存。
- 【包装】**聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜包装。12袋/盒。
- 【有效期】**36个月
- 【执行标准】**国家食品药品监督管理局标准YBH00552015
- 【批准文号】**国药准字H20052104
- 【生产企业】**企业名称：湖南华纳大药厂股份有限公司
生产地址：湖南浏阳生物医药园区
邮政编码：410331
电话号码：0731-82526001
传真号码：0731-82526002
网 址：Http://www.warrant.com.cn